

Este instructivo está diseñado para informarle de todos los detalles relacionados a la cirugía, y despejar cualquier duda que usted tenga en relación a este proceso.

La cirugía del estrabismo va dirigida a corregir la desviación de uno o ambos ojos. Esta cirugía puede estar indicada por motivos de función visual, tanto como por motivos de corrección estética de lo que implica un ojo desviado.

La cirugía se realiza en el pabellón de Instituto Oftalmológico Integral, el que se encuentra equipado con máquinas de alta gama de tecnología.

La cirugía del estrabismo tiene una duración aproximada de una a dos horas, luego de lo cual el paciente permanecerá en recuperación también entre una y dos horas, antes de ser dado de alta para regresar a su domicilio. La cirugía se realiza en ayunas. **Debe venir acompañado por una (1) persona el día de la cirugía.**

## Pre operatorio

### 1. Exámenes

- **Sangre:** hemograma completo, perfil bioquímico, ttpk y tiempo de protrombina (pruebas de coagulación).
- **Otros exámenes oftalmológicos:** según indicación de su médico tratante, dependiendo de cada caso en particular.
- **Niños:** requieren pase operatorio del pediatra, quien verá la necesidad de solicitar exámenes adicionales según cada caso particular.
- **Mayor de 40 años:** radiografía de tórax y electrocardiograma (ECG).
- **Mayor de 60 años:** pase cardiológico.

### 2. Entrevista con la Enfermera

- Alergias a medicamentos u otros.
- Medicamentos que usted toma actualmente.
- Ayuno el día de la cirugía.
- Otras indicaciones del preoperatorio: pintura uñas, maquillaje, joyas, ducha pre operatoria, prótesis dentales.

### 3. Formularios a Completar

- Informativo GES.
- Entrevista pre admisión.
- Autorización cirugía (consentimiento informado).
- Trámites administrativos de pago (puede ser el mismo día de la cirugía).

· CONSULTAS · EXAMENES · CIRUGIAS · PARTICULARES · ISAPRES · FONASA NIVEL 3 ·

# Post operatorio

## 1. Controles

· 1 día · 7 días · 30 días

· La cantidad de los controles puede variar en cada caso en particular.

**Nota:** Los controles durante los primeros 15 días son sin costo. Esta serie de controles puede variar según cada caso e indicación de cada médico.

· Se indica generalmente gotas de antibiótico, antiinflamatorio y éstas se mantienen por unas semanas.

## 2. Exámenes

Los exámenes post operatorios en caso de ser necesarios no están incluidos en el precio de la cirugía.

## 3. Síntomas y precauciones después de la cirugía

- No tocar, presionar, apretar o frotar el ojo operado. Es normal tener sensación de cuerpo extraño en el ojo operado o una molestia similar a una pestaña en el ojo, como asimismo puede haber ardor, dolor leve a moderado y cefalea (dolor de cabeza).
- Gran parte de las molestias post operatorias tienen relación con la anestesia. Después de la cirugía regrese a su casa y permanezca en reposo relativo.
- En caso de tener visión doble, no se asuste, esto es esperable en el post operatorio. Esto, en caso de ocurrir, molesta más en adultos que en niños.
- Es esperable también tener grados variables de ojo rojo (por hemorragias subconjuntivales) y edema palpebral (párpados hinchados), ambas transitorias.
- Para poner las gotas o pomada indicada, hágalo deslizando el párpado inferior hacia abajo y coloque el medicamento en el fondo de saco conjuntival inferior.
- Sus lentes pueden variar después de la cirugía, su médico le indicará qué hacer en cada caso en particular.

SI DESPUES DE ESTE INSTRUCTIVO AUN LE QUEDA ALGUNA DUDA, POR FAVOR CONSULTE CON SU OFTALMOLOGO TRATANTE, CON LA ENFERMERA O A ALGUNA DE NUESTRAS ASISTENTES OFTALMOLOGICAS.

POR FAVOR GUARDE ESTE INSTRUCTIVO HASTA QUE SU MEDICO LE HAYA DADO DE ALTA, Y LEA CUANTAS VECES SEA NECESARIO HASTA QUE TODAS SUS DUDAS ESTEN CLARAS.

Dr. Gabriel Hammer K.  
Director Médico  
INSTITUTO OFTALMOLOGICO INTEGRAL

*Nuestro enfoque es su visión*

📞 8333 293 · [www.ioi.cl](http://www.ioi.cl)

